FOLFIRI+Ram 療法

適応	大腸癌

催吐性リスク	中等度

			Day1	Day8	Day14
Ramucirumab	8mg/kg	DIV，60min	●		
CPT-11	150mg/m^2	DIV，90min	●		
l-LV	200mg/m^2	DIV，120min	●		
5-FU	400mg/m^2	IV，bolus	●		
5-FU	2,400mg/m^2	CIV，46hr	●		

※トレフューザー typeT 使用

2週間毎，PDまで

	Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
① アロキシバッグ0.75mg	50mL		●																											
デキサート注射液	9.9mg		●																											
DIV	30min																													
② サイラムザ 8mg/kg			●																											
生理食塩液注	250mL		●																											
DIV	60min																													
③ イリノテカン 150mg/m^2			●																											
生理食塩液注	500mL		●																											
DIV	90min																													
③ レボホリナート 200mg/m^2			●																											
5%ブドウ糖液	250mL		●																											
DIV	120min																													
④ 5-FU 400mg/m^2			●																											
IV																														
⑤ 5-FU 2,400mg/m^2			●																											
生理食塩液注	140mL		●																											
CIV	46hr																													