III-4-05

mFOLFOX6+biweeklyCmab 療法

適応	大腸癌

催吐性リスク	中等度

			Day1	Day8	Day14
Cetuximab	500mg/m²	DIV，120min	●		
L-OHP	85mg/m²	DIV，120min	●		
l-LV	200mg/m²	DIV，120min	●		
5-FU	400mg/m²	IV，bolus	●		
5-FU	2,400mg/m²	CIV，46hr	●		

※トレフューザー typeT 使用

2週間毎，PDまで

Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
① アロキシバッグ0.75mg 50mL		●																											
デキサート注射液 9.9mg		●																											
ポララミン注 5mg		●																											
DIV 30min																													
② アービタックス 500mg/m²		●																											
生理食塩液注 250mL		●																											
DIV 120min																													
③ 生理食塩液注 50mL		●																											
DIV 30min																													
④ オキサリプラチン 85mg/m²		●																											
5%ブドウ糖液 250mL		●																											
DIV 120min																													
④ レボホリナート 200mg/m²		●																											
5%ブドウ糖液 250mL		●																											
DIV 120min																													
⑤ 5-FU 400mg/m²		●																											
IV																													
⑥ 5-FU 2,400mg/m²		●																											
生理食塩液注 140mL		●																											
CIV 46hr																													