III-7-01

# FOLFIRINOX 療法

| 適応 | 膵癌 |
|---|---|

| 催吐性リスク | 高度 |
|---|---|

| | | | Day1 | Day8 | Day14 |
|---|---|---|---|---|---|
| L-OHP | 85mg/m² | DIV，120min | ● | | |
| l-LV | 200mg/m² | DIV，120min | ● | | |
| CPT-11 | 180mg/m² | DIV，90min | ● | | |
| 5-FU | 400mg/m² | IV，bolus | ● | | |
| 5-FU | 2,400mg/m² | CIV，46hr | ● | | |

※トレフューザー typeT 使用

2週間毎，PDまで

| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① アロキシバッグ0.75mg 50mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注射液 9.9mg | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 30min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② オキサリプラチン 85mg/m² | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5%ブドウ糖液 250mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 120min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ レボホリナート 200mg/m² | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5%ブドウ糖液 250mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 120min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ イリノテカン 180mg/m² | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液注 500mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 90min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 5-FU 400mg/m² | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 5-FU 2,400mg/m² | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液注 140mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIV 46hr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |