III-8-01

# STZ（weekly）療法

| 適応 | 膵・消化管<br>神経内分泌腫瘍 |
|---|---|

| 催吐性<br>リスク | 高度 |
|---|---|

| | | | Day1 | Day7 |
|---|---|---|---|---|
| STZ | 1,000mg/m$^2$ | DIV，30min | ● | |

1週間毎，

| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① ソルデム1輸液 500mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 120min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② アロキシバッグ0.75mg 50mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注射液 9.9mg | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 30min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ ザノサー 1,000mg/m$^2$ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液注 100mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 30min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 生理食塩液注 250mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 60min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |