III-8-03

5FU+STZ（Daily）療法

適応	膵・消化管 神経内分泌腫瘍

催吐性 リスク	高度

			Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	・・・・・	Day42
5-FU	400mg/m^2	DIV，30min	●	●	●	●	●		
STZ	500mg/m^2	DIV，30min	●	●	●	●	●		

6週間毎，

	Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
① ソルデム1輸液	500mL		●	●	●	●	●																	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
DIV	120min																							・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
② グラニセトロンバッグ 3mg	50mL		●	●	●	●	●																	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
デキサート注射液	6.6mg		●	●	●	●	●																	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
DIV	30min																							・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
③ 5-FU 400mg/m^2			●	●	●	●	●																	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
生理食塩液注	100mL		●	●	●	●	●																	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
DIV	30min																							・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
④ 生理食塩液注	50mL		●	●	●	●	●																	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
DIV	15min																							・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
⑤ ザノサー 500mg/m^2			●	●	●	●	●																	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
生理食塩液注	100mL		●	●	●	●	●																	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
DIV	30min																							・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
⑥ 生理食塩液注	250mL		●	●	●	●	●																	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
DIV	60min																							・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	