II-1-04

# FEC100 療法

| 適応 | 乳癌 | 催吐性リスク | 高度 |
|---|---|---|---|

| | | | Day1 | Day8 | Day15 | Day21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-FU | 500mg/m$^2$ | DIV，15min | ● | | | |
| EPI | 100mg/m$^2$ | DIV，15min | ● | | | |
| CPA | 500mg/m$^2$ | DIV，60min | ● | | | |

3週間毎，4コース

| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① アロキシバッグ0.75mg 50mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注射液 9.9mg | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 15min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② エピルビシン 100mg/m$^2$ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液注 100mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 15min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 5-FU 500mg/m$^2$ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液注 50mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 15min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ エンドキサン 500mg/m$^2$ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液注 250mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 60min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |